Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU | Ministero dell'Università e della Ricerca | Italiadomani Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | NODES Nord Ovest Digitale E Sostenibile

Scheda prodotta con il progetto STAMBECCO, finanziato nell'ambito dei Bandi a Cascata del Programma NODES, sostenuto dal MUR sui fondi PNRR MUR - M4C2 - Investimento 1.5 Avviso "Ecosistemi dell'Innovazione", nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Grant agreement Cod. n.ECS00000036)

Sheet produced by the project STAMBECCO, which has received funding from Cascade funding calls of NODES Program, supported by the MUR - M4C2 1.5 of PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU (Grant agreement no. ECS00000036)

I pascoli pingui

Nome Rete Natura 2000 • Natura 2000 Name: **non rappresenta un habitat della Rete Natura 2000 •** ***It is not a Natura 2000 habitat protected under the Habitats Directive***

Codice Rete Natura 2000 • Natura 2000 code: -

Protezione • Protection: **-**

Località • Locality: Alpe Casere, Alpe Salei



Descrizione: Si tratta di praterie erbacee, sviluppate su suoli fertili arricchiti dal pascolamento bovino, diffuse in ambienti freschi e pianeggianti o poco acclivi, dal piano montano fino alle vallette nivali. La composizione floristica può includere specie di nardeti, da cui si differenziano per la maggior abbondanza di nutrienti nel suolo e conseguentemente per il maggior numero di specie foraggere (soprattutto graminacee) a discapito delle specie più rare e/o di interesse conservazionistico (es: orchidee).

Description: These are species-rich grasslands, developing on fertile soils enriched by cattle grazing, occurring in cool, flat or gently sloping areas from the montane belt up to snowbed valleys. The floristic composition may include species typical of *Nardus* grasslands, but differs from them due to the higher nutrient content in the soil and, consequently, a greater abundance of forage species (mainly *Poaceae*), to the detriment of rarer species and/or those of conservation interest (e.g., orchids)."

neorurale | acqua & sole | Università di Pavia Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente

Scheda prodotta con il progetto STAMBECCO, finanziato nell'ambito dei Bandi a Cascata del Programma NODES, sostenuto dal MUR sui fondi PNRR MUR - M4C2 - Investimento 1.5 Avviso "Ecosistemi dell'Innovazione", nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Grant agreement Cod. n.ECS00000036)

Sheet produced by the project STAMBECCO, which has received funding from Cascade funding calls of NODES Program, supported by the MUR - M4C2 1.5 of PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU (Grant agreement no. ECS00000036)

Specie guida o frequenti: *Achillea millefolium aggr., Agrostis capillaris, Alchemilla vulgaris aggr., Dactylis glomerata, Deschampsia cespitosa, Festuca rubra* s.l., *Leontodon hispidus*, *Lotus corniculatus, Phleum rhaeticum*, *Poa alpina, Prunella vulgaris, Sagina saginoides*, *Trifolium badium*, *Trifolium pratense, Trifolium repens, Ranunculus montanus*, *Veronica serpyllifolia*.

Range altitudinali: Tra 1.500 e 2.000 m s.l.m., dal piano altomontano alla fascia subalpina.

Gestione: Il mantenimento degli usi tradizionali, in particolare un pascolamento razionale, contribuisce a preservare l'integrità di queste comunità erbacee di buona qualità foraggera. Una corretta gestione degli animali permette di evitare l'impoverimento floristico dovuto a carichi animali eccessivi con conseguente eccessivo calpestio, brucamento o apporto di nutrienti. Questo approccio permette di conservare sia la biodiversità dell'habitat sia il tipico paesaggio alpicolturale.

Note:

Guide or common species: *Achillea millefolium aggr., Agrostis capillaris, Alchemilla vulgaris aggr., Dactylis glomerata, Deschampsia cespitosa, Festuca rubra* s.l., *Leontodon hispidus*, *Lotus corniculatus, Phleum rhaeticum*, *Poa alpina, Prunella vulgaris, Sagina saginoides*, *Trifolium badium*, *Trifolium pratense, Trifolium repens, Ranunculus montanus*, *Veronica serpyllifolia*.

Altitude range: Between 1500 and 2000 m a.s.l., from the upper montane to the subalpine belt.

Management: The maintenance of traditional land-use practices, particularly rational grazing, contributes to preserving the integrity of these herbaceous communities with good forage quality. Proper livestock management helps prevent floristic impoverishment caused by excessive stocking rates, which lead to over-trampling, overgrazing, or nutrient overload. This approach ensures the conservation of both the habitat's biodiversity and the typical alpine pastoral landscape.

Note:

Autori dei testi/*Text authors*: Silvia Assini, Matteo Barcella, Cristina Caporusso