Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Università e della Ricerca
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
NODES Nord Ovest Digitale E Sostenibile

Scheda prodotta con il progetto STAMBECCO, finanziato nell'ambito dei Bandi a Cascata del Programma NODES, sostenuto dal MUR sui fondi PNRR MUR - M4C2 - Investimento 1.5 Avviso "Ecosistemi dell'Innovazione", nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Grant agreement Cod. n.ECS00000036)

Sheet produced by the project STAMBECCO, which has received funding from Cascade funding calls of NODES Program, supported by the MUR - M4C2 1.5 of PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU (Grant agreement no. ECS00000036)

I romiceti

Nome Rete Natura 2000 • Natura 2000 Name: **non rappresenta un habitat della Rete Natura 2000 •** ***It is not a Natura 2000 habitat protected under the Habitats Directive***

Codice Rete Natura 2000 • Natura 2000 code: **-**

Protezione • Protection: **nessun livello di protezione •** ***no level of protection***

Località • *Locality*: **in prossimità di tutte le malghe (Casere, Salei, Alpe del Lago)**



Descrizione: Comunità erbacee nitrofile dei pascoli montani sviluppate su suoli umidi, ricchi in humus, nitrati e potassio, tipici di aree con elevato carico di bestiame (malghe, impluvi, aree di riposo). Queste vegetazioni, dominate da specie come romice alpino (*Rumex alpinus)*, sono povere di specie e si formano in seguito a calpestio intenso e apporti organici elevati (deiezioni animali).

Description: Nitrophilous tall herb communities of mountain pastures, developing on moist soils rich in humus, nitrates, and potassium, typical of areas with high livestock pressure (alpine huts, small valleys, livestock resting sites). These communities, dominated by species such as *Rumex alpinus*, are species-poor and arise from intense trampling and high organic matter input (animal droppings).

neorurale
acqua & solé
UNIVERSITÀ DI PAVIA Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente

Scheda prodotta con il progetto STAMBECCO, finanziato nell'ambito dei Bandi a Cascata del Programma NODES, sostenuto dal MUR sui fondi PNRR MUR - M4C2 - Investimento 1.5 Avviso "Ecosistemi dell'Innovazione", nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Grant agreement Cod. n.ECS00000036)

Sheet produced by the project STAMBECCO, which has received funding from Cascade funding calls of NODES Program, supported by the MUR - M4C2 1.5 of PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU (Grant agreement no. ECS00000036)

Specie guida o frequenti: *Alchemilla glabra, Cerinthe glabra, Chenopodium bonus-henricus, Galeopsis tetrahit, Poa supina, Poa trivialis, Rumex alpestris, Rumex alpinus Silene dioica, Stellaria nemorum, Urtica dioica.*

Range altitudinali: 1400–2000 m s.l.m

Gestione: Per impedire la formazione del romiceto è necessario un pascolo razionale, evitando che il bestiame stazioni ripetutamente/troppo a lungo nelle stesse zone (pascolo a rotazione).
Per contrastarne invece la diffusione sono necessari degli sfalci ripetuti più volte l'anno e per più anni. Le superfici recuperate vanno poi recintate, quindi traseminate adeguatamente con specie locali tipiche dei pascoli ricchi in specie (es: nardeti).

Note: Si osserva comunemente in prossimità delle malghe e nei punti di sosta del bestiame.

Guide or common species: *Alchemilla glabra, Cerinthe glabra, Chenopodium bonus-henricus, Galeopsis tetrahit, Poa supina, Poa trivialis, Rumex alpestris, Rumex alpinus Silene dioica, Stellaria nemorum, Urtica dioica*

Altitude range: 1400–2000 m a.s.l.,.

Management: To prevent the formation of dock-dominated vegetation, rational grazing is essential, avoiding repeated or prolonged livestock presence in the same areas (rotational grazing).
To control its spread, repeated mowing is required several times a year and over multiple years. The restored areas should then be fenced and properly reseeded with local species typical of species-rich pastures (e.g., *Nardus* grasslands).

Note: It is commonly observed near alpine pasture huts and livestock resting areas.

Autori dei testi/*Text authors*: Silvia Assini, Matteo Barcella, Cristina Caporusso