Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Università e della Ricerca
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
NODES Nord Ovest Digitale E Sostenibile

Scheda prodotta con il progetto STAMBECCO, finanziato nell'ambito dei Bandi a Cascata del Programma NODES, sostenuto dal MUR sui fondi PNRR MUR - M4C2 - Investimento 1.5 Avviso "Ecosistemi dell'Innovazione", nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Grant agreement Cod. n.ECS00000036)

Melitaea diamina



Melitaea diamina è il nome scientifico della **damina** o **fritillaria di diamina**, una farfalla appartenente alla famiglia **Nymphalidae** (sottofamiglia *Nymphalinae*).

❖ Aspetto

- Apertura alare: circa 32–42 mm.
- Ali arancioni con disegni neri a reticolo, caratteristici delle fritillarie.
- La parte inferiore delle ali posteriori presenta un motivo a bande bianco-crema e arancioni, utile per distinguerla da specie simili.

❖ Distribuzione

- Diffusa in gran parte dell'Europa e in regioni temperate dell'Asia.
- In Italia è presente soprattutto in zone alpine e prealpine, ma anche in aree collinari umide.

❖ Bruco (larva)

- Si nutre principalmente di piante della famiglia Plantaginaceae e Scrophulariaceae, in particolare Veronica e Plantago.
- I bruchi sono neri con macchie e piccole spine.

❖ Habitat

- Preferisce radure, prati umidi, margini di boschi e zone erbose ricche di fiori.
- È più comune in ambienti freschi e umidi.

❖ Ciclo vitale

- In genere ha due generazioni all'anno (*specie bivoltina*), con voli da maggio a giugno e poi da luglio ad agosto.
- Sverna come bruco giovane.

❖ Ecologia e conservazione:

- Importante come parte delle catene alimentari dei prati fioriti.
- In alcune zone è in declino a causa della perdita di habitat umidi e del cambiamento dell'uso agricolo dei suoli.

neorurale

acqua & sole